






# パス名： RALS治療(腔内照射)を受けられる 患者様へ

主治医:	月 日	外来	看護師:	月 日	入院(ラルス前日)	月 日	(ラルス当日・治療前)	月 日	ラルス治療後	月 日	ラルス後1日目(退院日)
目標		治療に向けての準備ができる			不安に思っている事が表出でき、治療に臨むことができる		治療に対して理解ができる		・発熱・出血がない		合併症がなく退院できる
処置 薬剤		診察: ※ 入院決定後、外来で処方された内服薬の確認をします。 内服薬 1日分・お薬手帳を持参している場合は薬剤部5窓口で確認をします。  身長( cm) 体重( Kg)			※日曜日の入院です ※入院は( )時まで <b>救急外来窓口</b> にて手続きを済ませて1階西病棟までお越し下さい 計測:検温、脈拍、血圧  身長( cm) 体重( Kg)  入院オリエンテーションがあります ・現在内服中の薬の確認をいたします 内服中のお薬は持参してください		ラルス治療予定時間は検査の進行により入室時間変更になる場合がございます ※正確な時間決定しましたらご案内します。  ・病衣(ガウン)に着替えたら、点滴を開始します。( ) ・使い捨てパンツ(前空き)に着替えます。( ) ※使い捨て <b>パンツ</b> は病院で用意します。  ・治療室入室約1時間前に造影剤を飲んでいただきます。 ガストログラフィン1.5ml+水50ml( )  ・主治医へ確認後、指示された通りに 内服薬をお飲み下さい。		治療終了後はストレッチャーで病室へ戻ります。 ・点滴と酸素マスクは継続します ・尿の管が入ってますので尿は自然と排泄されます。  酸素吸入は術後3時間で、麻酔からの覚醒状態を観察し、経過良好なら終了となります。  吐き気がある時は、吐き気止めを使います。  ・指示された通りに内服薬をお飲み下さい。  		・朝、尿の管を抜きます。 ※退院前に診察があります。  ・退院時に必要な薬などあれば早めに医師に申し出て下さい    *放射線科外来にて診察・内診があります。
検査							治療室には( )時ごろ(歩行・車いす・ストレッチャー)で入室する予定です。				
活動 安静度 保清		制限なし			制限なし ※病棟外に出られるときは看護師に声をかけてください シャワー浴		・自由です。輸液開始後は病棟内でお過ごしください。  		・麻酔から覚めるまでベッド上安静です。 ・最初の歩行には看護師が付き添います ※ ナースコールにて連絡下さい。  ・吐き気や出血(流れるような感触など)がありましたらナースコールにて連絡下さい。		シャワーに入れます ・局部の清潔に心がけましょう。  
食事		制限なし 			制限なし		普通食 治療直前の食事は禁食となります 午前中予定: 朝食 午後予定: 昼欠食		麻酔より覚めて、嘔吐や気分不良なれば食事摂取可能です		・退院時に次回外来の予約票と診察券をお渡しします。
説明 ご家族への説明		・主治医からの治療の説明があります( ) 治療承諾書( ) ・看護師からの説明・入院案内			・入院生活及びRALS治療について看護師から説明があります ・入院診療計画書 ・治療同意書を提出してください。		・治療は平均1人1時間半~2時間程かかります。				※次回治療日(入院日) / ( ) 《注意事項》 退院後は局部の清潔に気を付けましょう。
治療時の 必要物品					・詳細はパンフレットを参照ください 着替え用ショーツ 1枚 ナフキン 1個 ・入院時には内服しているお薬を必ず持参してきてください ・マニキュアなどは落としておいてください		治療室へ持参する物 ・着替え用ショーツ 1枚 ・ナフキン 1個  * 保険、診断書等の書類は2階の診断書受付窓口へ提出してください				何か異常がありましたら、病院にご連絡ください  琉球大学病院 1西放射線科病棟 TEL 098-895-3331(代)内線3101