

平成 28 年 3 月 4 日

各科診療科  
中央診療施設等  
看護部  
事務部 各位

検査・輸血部 部長  
前田 士郎


### 「コルチゾール」測定試薬の変更と測定値への影響について（通知）

現行の「コルチゾール」測定試薬では、他のステロイドホルモンとの交差反応がみられることが知られています。新試薬では試薬中の抗体の変更により、この交差反応を軽減し、より精度の高い測定値が得られるよう改良されています。改良新試薬発売に伴い現行試薬は発売中止となることから、「コルチゾール」測定試薬を新試薬に変更いたします。なお、新試薬による測定値は現行試薬測定値に比べ、若干低値になる傾向があります（下図参照）。以上の点につきまして関係各位への周知方、宜しくお願い致します。

#### 記

- (1) 変更日時：平成 28 年 4 月 1 日（金）受付検体より
- (2) 改良新試薬と現行試薬との相関（下記図参照）

改新試薬による測定値は現行試薬測定値に比べ若干低値となる傾向があります。



- (3) 基準範囲：6.24～18.0  $\mu\text{g/ml}$ （起床後午前中）

現在、日内変動を考慮し表示していませんが今後、上記基準範囲を表示します。

なお、検査の依頼方法、測定結果の報告方法、結果参照の方法に変更はありません。

問い合わせ先：生化学検査室（3337）